A köhögés, meghűlés gyógyszerei


Megfázás, meghűlés, nátha

A felső légúti nyálkahártyák védekezőképességének lehűlés okozta átmeneti meggyengülése következtében vírusfertőzés okozza

Helyi tünet az orrváladékozás, orrdugulás, tüsszögés, torokfájás, köhögés, láz



Elsősorban az orr, a torok nyálkahártyáját támadja, de a tüdőben is megjelenhet



rhinitis

pharingitis

tonsillitis

bronchitis

bronchiolitis

Nátha vagy influenza?

Tünetek	Megfázás, nátha	Influenza
Láz	Hőemelkedés, 1-2 napig	Magas, 3-4 napig
Fejfájás	Ritka	Gyakori
Izomfájdalom	Ritka, enyhe	Gyakori, súlyos is lehet
Gyengeség, elesettség	Néha	Jellemző, 2-3 hétig is tarthat
Súlyos kimerültség	Soha	Jellemző, a betegség kezdetén
Orrfolyás, orrdugulás	Jellemző	Ritka
Tüsszentés	Jellemző	Néha
Torokfájás	Jellemző	Néha
Köhögés (száraz)	Enyhe, közepes	Jellemző, súlyos is lehet
Szövődmények	Melléküreg gyulladás, középfülgyulladás	Melléküreg gyulladás, hörghurut, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, mely életveszélyes is lehet
Megelőzés	Higiénés rendszabályok, papír zsebkendő, kézmosás,betegek kerülése stb.	Higiénés rendszabályok, papír zsebkendő, kézmosás,betegek kerülése, stb.VédőoltásNéha antivirális szerek
Kezelés	Orrcsepp, orrsprayLáz- fájdalom és gyulladáscsökkentők	Láz- fájdalom és gyulladáscsökkentők, antivirális szerek

Szövődmények



Kezelés, gyógyszerek

Tüneti kezelés




OTC = Over the counter („pulton keresztül")

Recept nélkül kiadható gyógyszerek

- Láz-, és fájdalomcsillapítók
- Köhögés elleni szerek
- Orrcsepp, orrspray, orrkenőcs
- Torokfájás elleni helyi hatású gyógyszerek

Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentők



N02BA
Szalicilsav és származékai

ALKA-SELTZER
ASPEGIC
ASPICONT
ASPIRIN
ASPIRIN COMPLEX
ASPIRIN EFFECT
ASPIRIN PLUS C
ASPIRIN ULTRA
KALMOPYRIN
LASQUIL
TABLETTA ANTIDOLORICA
TABLETTA CHINACISALIS CUM VITAMINO C FoNo VII.

N02BB
Pirazolonok


ALGOPYRIN
ALGORAPID
ALGOZONE
DEMALGON
FLAMBORIN
GERMICID
GERMICID-C
METAMIZOL
METAPYRIN
METARAPID
NODORYL
OPTALGIN
PANALGORIN
QUARELIN
SUPPOSITORIUM ANALGETICUM FoNo VII.
SUPPOSITORIUM ANTIPYRETICUM PRO INFANTE FoNo VII.
SUPPOSITORIUM ANTIPYRETICUM PRO PARVULO FoNo VII.
SUPPOSITORIUM NORAMINOPHENAZONI FoNo VII.
TABLETTA ANALGETICA FoNo VII.



N02BE
Anilidek

ANTINEURALGICA
BEN-U-RON
BÉRES FEBRILIN
BÉRES TRINELL PRO
COLDAMIN BÉRES
COLDREX
COMBIDOLEX
COMBOGESIC
DOLORAMOL
DOLUXIO COMBI
FLUMIN BÉRES
FLUNATHAN SANDOZ
GRIPPOSTAD HOT DRINK
HOTMAX
IBUPAROL
MEXALEN
MIRALGIN
NEO CITRAN
NO-SPALGIN
PANADOL
PARACETAMOL
PARAFIZZ
PARAMAX
PARCODIN
RUBOPHEN
SARIDON
SUPOFEN
SYMPTOMED WICK
TACHIPIRIN 1000
TALVOSILEN FORTE
TANTOGRIP
TEVA-HOTMAX
TEVA-MEXALEN
WICK COLD and FLU MAX

Orrcseppek, orrkenőcsök



R01AA
szimpatomimetikumok önmagukban

AFRIN
ALLENASAL
AQUASPIRA
LOLIMARINE HA
NASIVIN
NOVORIN
OTRIVIN
RHINATHIOL
RHINOSPRAY PLUS
RINOMARIS
SNUP
WICK SINEX
XILOMARE

R01AB
szimpatomimetikumok kombinációi

NAPHAZOLIN
NASIC
OTRIVIN ALLERGIA
OTRIVIN EXTRA
OTRIVIN KOMPLEX
OTRIVIN PLUS
RINOFLUIMUCIL
SEPTANAZAL
TEVA-NAZAL
VIBROCIL

R01AC
Antiallergénumok

ALLERGODIL
TALEUM

R01AD
Kortikoszteroidok

Avamys
BECLONASAL AQUA
BILENI
BLOCTIMO
DYMISTA
FLIXONASE
FLUTIRIN
KALMENTE
METMIN
MOMEPAX CONTROL
MOMETASON
NASACORT
NASONEX
NASOTASONE
RHINOCORT AQUA


R01AX
Egyéb nazális készítmények

BACTROBAN
COLDASTOP
Delufen
Euphorbium Compositum-Heel
MUPIROCIN INFECTOPHARM
NASOPAX
PAXIRASOL
UNGUENTUM NASALE FoNo VII.

R01B
Szisztémás orr-ödéma-csökkentők

ALGOFLEX COLD
CLARINASE
RHINATHIOL COLD
ZYRTEC-D

Köhögés csillapítás



R05CA
Köptetők

BRONCHICUM
BRONCHIPRET
BRONCHOSTOP
HEDELIX
HERBION
IVYPAN
MIXTURA PECTORALIS FoNo VII.
PROSPAN
ROBITUSSIN EXPECTORANS
SOLEDUM
SOLEDUM FORTE
WICK GUAIFENOMED

R05CB
Nyákoldók

ACC
ACETILCISZTEIN
AMBROBENE
AMBROXOL
Bronchitol
BROXIO
ERDOMED
FLAVAMED
FLUIMUCIL
HALIXOL
HUSTAGIL
LOLIMUCIN
LYXIO
MUCOFREE
MUCOPRONT
MUKAMBRO
NEO-BRONCHOL
PAXIRASOL
PECTODRILL
PULMOZYME
RHINATHIOL
RHINATHIOL köptető
SINUPRET
SINUPRET
SOLMUCOL
SPUTOPUR

R05DA
Ópium alkaloidok és származékaik

CODERIT N
CODINEP
HYDROCODIN
MEDDEX WICK
RHINATHIOL
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
STOPROPHARM
TUSSODRILL
TUSSOPRONT

R05DB
Egyéb köhögéscsillapítók

LEVOPRONT
LIBEXIN
NEO CITRAN ANTITUSSIVE
NORIGONEP
RHINATHIOL TUSSO
SINECOD

R05X
Egyéb meghűlés elleni készítmények

ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM FoNo VII.
ERIGON
Aflubin
ANTIPOLL FORTE
BABY LUUF
ESBERITOX
GRIPPOMED WICK
GRIPPOSTAD C
IBUPROFEN/PSZEUDOEFEDRIN WICK
LOLIGRIP
MUCOGRIP
NEO CITRAN COLD AND SINUS
WICK TRIACTIN
WICK VAPORUB



Torokfájás elleni helyi hatású szerek





R02AA
Antiszeptikumok

ANGISED
FARINGOPRONT
GLYCOSEPT
HALSET
MEBUCAIN
MUCOANGIN
NEO-ANGIN
ORODRILL
PHLOGOSOL
SEPTOFORT
SEPTOLETE
STREPSILS



R02AX
Egyéb gégészeti készítmények

ANGIFORT
FLURBIPROFEN
LOLISEPT
STREPFEN
TANTUM VERDE



R02AB
Antibiotikumok

BIOPAROX
DORITHRICIN



Kérdések



Mi jellemző a száraz köhögésre ?

A) Bőséges váladékkal jár

B) Fullasztó, váladék nélküli

C) Mindig bakteriális eredetű

D) Csak éjjel jelentkezik



Kérdések



Mi NEM javasolt meghűlés esetén ?

A) Bőséges folyadékfogyasztás

B) Nyugalom, pihenés

C) Antibiotikum szedése minden esetben

D) Vitaminpótlás



Kérdések



Melyik kórokozó okozza leggyakrabban a megfázást ?

A) Influenza vírus

B) Streptococcus baktérium

C) Rhinovírus

D) Candida gomba



Kérdések



Mennyi ideig tart általában egy egyszerű megfázás ?

A) 1–2 nap

B) 3–7 nap

C) 10–14 nap

D) Több mint 1 hónap



Kérdések



Melyik hatóanyag használható gyakran köptetőként ?

A) Paracetamol

B) Ambroxol

C) Ibuprofen

D) Loratadin



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A megfázás általában vírusos eredetű betegség
ezért a megfázást antibiotikummal lehet hatékonyan kezelni.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A torokfájás gyakori tünete a meghűlésnek,
a torokfájás mindig bakteriális fertőzés jele.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A gyermekeknél fokozott figyelemmel kell alkalmazni a köhögéscsillapító szereket,
bizonyos hatóanyagok nem ajánlottak 6 éves kor alatt.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A megfázás ellen védőoltás áll rendelkezésre,
és az influenza elleni oltás a megfázást is megakadályozza.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A köptetőket éhgyomorra kell szedni,
mert a köptetők célja a váladék fellazítása és kiürülése.

